



## Acer platanoides 'Reitenbachii'



<b>Height</b>	15-20 m
<b>Width</b>	10-12m
<b>Crown</b>	broad ovoid, dark, dense crown
<b>Bark and branches</b>	grey
<b>Leaf</b>	green, redbrown
<b>Flowers</b>	yellowgreen, flowers in April
<b>Fruits</b>	brown, inconspicuous
<b>Spines/thorns</b>	None
<b>Toxicity</b>	has toxic components
<b>Soil type</b>	clayed soil, loamy soil, sandy soil
<b>Soil moisture</b>	withstand short flood
<b>Paving</b>	tolerates partial paving
<b>Winter hardness zone</b>	4 (-34,4 to -28,9 °C)
<b>Wind resistance</b>	not very sensitive, not resistant to sea wind
<b>Other resistances</b>	resistant to frost (WH 1 - 6)
<b>Fauna tree</b>	resistant to frost (WH 1 - 6), valuable for butterflies
<b>Application</b>	avenues and broad streets
<b>Shape</b>	clearstem tree

Istoria Acer platanoides "Reitenbachii" datează de la pepiniera lui J. Reitenbach din Polonia, apoi din Rusia. Planta a fost denumită de Johann Xaver Robert Caspary, un botanist german, dar pepiniera belgiană a lui Louis Van Houtte a fost cea care a comercializat-o. Din punct de vedere al portului, "Reitenbachii" este asemănător cu specia. Frunzele despletite sunt maro închis strălucitor și devin verde închis mat cu nervuri roșu închis în timpul verii. Arbore frumos, oarecum asemănător cu 'Schwedleri', ale cărui culori ale frunzelor sunt mai intense. Crește în toate solurile, dar nu tolerează apele subterane stagnante și solurile turbuloase.