



## Cornus controversa



<b>Height</b>	6 – 8 (15) m
<b>Width</b>	6-8m
<b>Crown</b>	round, branching in layers, half-open crown, capricious growing
<b>Bark and branches</b>	green brown with shallow veins
<b>Leaf</b>	wide ovate to wide oval, green, 8 – 15 cm
<b>Autumn colour</b>	red, purple
<b>Flowers</b>	cream white, in umbel clusters, May/June
<b>Fruits</b>	small dark-blue berry
<b>Spines/thorns</b>	None
<b>Toxicity</b>	usually not toxic to people, (large) pets and livestock
<b>Soil type</b>	all, if well-drained, no dry sandy soil
<b>Paving</b>	tolerates no paving
<b>Winter hardiness zone</b>	6b (-20,5 to -17,8 °C)
<b>Wind resistance</b>	good
<b>Other resistances</b>	resistant to frost (WH 1 - 6), can withstand wind
<b>Fauna tree</b>	resistant to frost (WH 1 - 6), can withstand wind, provides food for birds
<b>Application</b>	tree containers, small gardens, patio gardens
<b>Shape</b>	clearstem tree, multi-stem treem
<b>Origin</b>	Japan, Korea, China

Arbore mic a căruia caracteristică principală este ramificarea orizontală, care crește în trepte. În arealul său natural, crește uneori până la o înălțime de 15 m. Coroana poate crește la fel de mult ca și înălțimea sa. Crengile au culoarea de la roșu-maroniu la gri. Frunzele alterne sunt neregulate ca formă și mărime și au o culoare verde închis lucios. Fața inferioară este de un albastru-verde izbitor. Toamna, devine roșu-violet. Corimbii de flori în formă de umbeliță pot atinge aproximativ 15 cm în diametru. Ele se află pe tulpi scurte și sunt dispuse pe ramificații orizontale. Bacele numeroase, de culoare albastru închis, apar toamna. În Țările de Jos, fructificarea este foarte variabilă și cu siguranță nu este garantată. Înrădăcinează superficial, cu un sistem radicular fin. Din cauza surgerii timpurii a sevei primăvara, tăierea trebuie să aibă loc vara sau toamna.